

هكذا نحمي أنفسنا. 

لدي أسئلة عن تطعيم كوفيد 19 والحمل

هل يجب علي الحصول على التطعيم ضد كوفيد 19، عندما أكون حاملاً أو عندما أرغب في الحمل؟

نوصيك بالحصول على التطعيم ضد كوفيد 19 قبل الحمل وأثنائه (من الناحية المثالية ابتداءً من الأسبوع الـ 12 في الحمل). ويرجع ذلك إلى أن المسارات المتدهورة لتطور كوفيد 19 تكون أكثر شيوعاً لدى النساء الحوامل مقارنةً بنظرائهن غير الحوامل، حيث ترتفع لديهن خطورة الولادة المبكرة بشكل واضح عند إصابتهن بفيروس كورونا أثناء الحمل. والحصول على التطعيم قبل الحمل أو أثنائه يوفر الحماية اللازمة لك أنتِ وجنينك.

التطعيم ضد كوفيد 19 آمن لك، إن كنت حاملاً أو ترغبين في الحمل. كل اللقاحات المصرح بها في سويسرا يتم فحصها ودراستها بعناية للتحقق من سلامتها، كما أنها تخضع للمتابعة الدقيقة باستمرار في المستقبل.

ليس للقاح أي آثار سلبية على الخصوبة.

يمكنك الحصول على التطعيم في أي وقت في خلال دورتك الشهرية. يمكنك الحصول على التطعيم أيضاً إذا كنتِ ترضعين.

إن كنتِ حاملاً أو تخططين للحمل ولديك أسئلة عن التطعيم، فتحدثي إلى طبيبتك أو طبيبك أو القابلة التي تولدك.

foph-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP